

# STOMACHON<sup>®</sup> easy lax

M.G. - L.199  
09/2025

**Compoziție:** Glicol polietilenic, semințe de psyllium (Plantago psyllium) și coajă, gumă de guar, acid citric, aromă de portocală, dioxid de siliciu, îndulcitori: sorbitol, acesulfam K, sucraloza.

#### FĂRĂ GLUTEN | FĂRĂ CONSERVANȚI

**Indicații:** Stomachon EasyLax pulbere pentru soluție orală este un laxativ indicat în tratamentul constipației ocazionale și cronice la adulți, adolescenți și copii.

**Mod de utilizare:** deschideți plicul și turnați conținutul într-un pahar de 200 ml. Umpleți-l apoi cu apă plată (necarbogazificată). Amestecați bine timp de 10-15 secunde și beți imediat după dizolvarea pulberii. În loc de apă, se pot folosi ceaiuri, infuzii de plante, lapte, iaurt, sucuri de fructe obișnuite sau proaspăt stoarse. Eventuala consistență mai crescută a soluției este o caracteristică a produsului. Pentru rezultate optime, se recomandă să beți după aceea 1-2 pahare de apă. Stomachon EasyLax pulbere pentru soluție orală poate fi administrat oricând pe parcursul zilei, cu cel puțin jumătate de oră înainte de culcare.

**Adulți:** 2 plicuri pe zi, preferabil dimineața și seara.

**Copii și adolescenți cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani:** 1 plic pe zi.

În general, durata tratamentului este de aproximativ 2 săptămâni. Dacă constipația este cauzată de o boală precum Parkinson sau scleroza multiplă, sau dacă se administrează alte produse ce cauzează constipație, medicul ar putea recomanda utilizarea Stomachon EasyLax pulbere pentru soluție orală pe o perioadă mai lungă de 2 săptămâni. În general, în tratamentul pe termen lung, doza este de 1 plic pe zi.

**Състав:** Полиетилен гликол, кутикула от семена на псилиум (Plantago psyllium), гума гуар, лимонена киселина, аромат на портокал, силициев диоксид, подсладител: сорбитол, ацесулфам К, сукралоза.

#### БЕЗ ГЛУТЕН | БЕЗ КОНСЕРВАНТИ

**Показания:** Стомахон Изилакс прах за перорален разтвор е слабително средство, показано за лечение на случаен и хроничен запек при възрастни, юноши и деца.

**Начин на употреба:** отворете сашето и изсипете съдържанието в чаша (200 ml). Напълнете с питейна вода (негазирана). Разбъркайте добре за около 10-15 секунди и изпийте веднага след разтваряне на праха. Като алтернатива на водата можете да използвате чай, други течности, прясно мляко, кисело мляко, плодови сокове или прясно изцедени сокове. Eventualното увеличаване на консистенцията на разтвора е характеристика на продукта. За постигане на оптимален резултат се препоръчва след това да изпийте 1-2 чаши вода. Стомахон Изилакс прах за перорален разтвор може да се приема по всяко време на деня, поне половин час преди лягане.

**Възрастни:** по 2 сашета дневно, за предпочитане сутрин и вечер.

**Деца и юноши на възраст от 3 до 14 години:** по 1 саше на ден.

По принцип продължителността на лечението е около две седмици. Ако запекът е причинен от заболяване като болест на Паркинсон или множествена склероза или ако приемате други продукти, които причиняват запек, Вашият лекар може да Ви посъветва да приемате Стомахон Изилакс прах за перорален разтвор за период по-дълъг от 2 седмици. Обикновено при продължително лечение дозата е 1 саше дневно.

**Опаковка:** 14 еднодозови сашета от 6 g

**Дистрибутор за България:** "Натурфарма България" ЕООД, гр. София 1164, ул. Янко Софийски 21, тел. 02/963 33 59, info@naturpharmabg.com

Срокът на годност се отнася за продукта в ненарушена опаковка, съхраняван правилно.

**Кога да не се използва, взаимодействия, странични ефекти:** прочетете внимателно листовката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се избягва контакт с очите.

Кутия PAP 21: Събиране на хартия. Проверете разпоредбите на вашата община. Съхранявайте медицинското изделие плътно затворено, на хладно и сухо място, защитено от светлина и топлина.

**Производител: Producător:**

FARMA-DERMA s.r.l  
Via dell'Artigiano 6-8  
40010 Sala Bolognese  
(BO) - Italy

# STOMACHON<sup>®</sup> easy lax

Стомахон Изилакс



**laxativ indicat**  
în tratamentul constipației  
ocasionale și cronice la adulți,  
adolescenți și copii.

**слабително средство,**  
показано за лечение на  
случаен и хроничен запек при  
възрастни, юноши и деца.

14 | пlicuri monodoză de 6 g  
pulbere pentru soluție orală

14 | еднодозови сашета от 6 g  
прах за перорален разтвор

LOT



**Амбалаж:** 14 пlicuri monodoză de 6 g

**Дистрибутор pentru România:** SC Naturpharma Products RO SRL, București, Sector 6, str. Nicodim, nr. 18, tel: 021.211.0117, email: office@sanatate-buna.com

Data de expirare se referă la produs în ambalajul intact, păstrat corect.

**Contraindicații, interacțiuni, efecte secundare:** citiți cu atenție prospectul din interiorul ambalajului.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor. Evitați contactul cu ochii.

Cutie PAP 21: Deșeurі de hârtie. Verificați dispozițiile administrației locale. Păstrați dispozitivul medical bine închis, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină și căldură.

**МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ**  
**DISPOZITIV MEDICAL**

CE 0373



BG-RO 58 REV 01

FB5003

BG/RO - FINEFOODS