



REFLUX PROTECTION & ACID DEFENCE

DISPOZITIV MEDICAL PENTRU TRATAMENTUL **REFLUXULUI ACID ȘI NON ACID GASTROESOFAGIAN ȘI PENTRU PROTECȚIA ESOFAGULUI**

COMPRIMATE ANTIREFLUX DIZOLVABILE ÎN GURĂ

Boala de reflux gastroesofagian (prescurtată BRGE) este o boală funcțională asociată cu un număr de simptome, cum ar fi:

- Arsură "în capul pieptului" (pirozis retrosternal)
- Regurgitație acidă sau alcalină cauzată de poziția orizontală, de alimente sau de substanțe iritante care pot cauza reflux (alcool, cafea, ceai, ciocolată, citrice etc.)
- Crampe
- Dificultate nedureroasă la înghițire (disfagie)
- Tuse iritativă
- Disfonie (răgușeală, afonie)

Aceste simptome pot fi asociate sau nu cu leziuni inflamatorii erozive ale mucoasei esofagiene. O dietă de proastă calitate sau un stil de viață stresant pot avea o influență majoră asupra producției sucului gastric, crescând aciditatea și cauzând o senzație de arsură dureroasă, în special după masă. Această aciditate excesivă poate fi resimțită și la nivelul stomacului din vecinătatea joncțiunii cu esofagul, ca și senzație de arsură, crampe, senzație de preaplin sau greață. BRGE se poate manifesta și în timpul somnului, deoarece poziția orizontală facilitează ajungerea sucului gastric în esofag. Deoarece pereții esofagului nu au o structură care să le permită tolerarea acidității sucului gastric, apare senzația de arsură în capul pieptului.

INDICAȚII

ESOXX REFLUX PROTECTION & ACID DEFENCE este un dispozitiv medical cu o acțiune mecanică recomandat în:

- tratamentul simptomatic al bolii de reflux gastroesofagian. Reduce rapid simptomele cum ar fi: arsura (pirozis), regurgitație acidă, durerea epigastrică, tuse iritativă și disfonie.
- tratamentul simptomatic al hiperacidității (durere ocazională și arsură la stomac).

ESOXX REFLUX PROTECTION & ACID DEFENCE este o combinație originală și inovativă de **sulfat de condroitină, acid hialuronic și hidroxid de aluminiu**. **ESOXX REFLUX PROTECTION & ACID DEFENCE** protejează de acțiunea iritativă a acidului clorhidric produs de stomac.

- Comprimatele se dizolvă inițial în gură, stimulând salivația și facilitând un contact mai bun între ingrediente și peretele esofagian, creând astfel protecție și lubrifiere.
- Sulfatul de condroitină aderă la mucoasa gastroesofagiană izolând-o și protejând-o astfel de atacul sucului gastric.
- Acidul hialuronic, combinat cu sulfatul de condroitină care are proprietăți aderente, protejează țesutul esofagian deteriorat și ajută la refacerea acestuia.
- Hidroxidul de aluminiu acționează ca un antiacid prin reducerea impactului sucului gastric asupra mucoasei lezate.

COMPOZIȚIE

Condroitin sulfat de sodiu (400 mg, de origine animală: pui), zaharoză, hidroxid de aluminiu (200 mg), carbonat de calciu, agenți antiaglomeranți: mono-, di- și trigliceride ale acizilor grași, dioxid de siliciu, hialuronat de sodiu cu masă moleculară mare (10 mg); aromă; îndulcitor: glicirizinat de amoniu.

FORMA DE AMBALARE

20 comprimate dizolvabile în gură de 1100 mg.

DOZE ȘI INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DOZE: Adulți și copii peste 12 ani: 1-2 comprimate după mesele principale și/sau înainte de a merge la culcare sau la nevoie atunci când apar simptome cum ar fi durere și arsură la stomac, conform recomandării medicului.

Copii peste 6 ani: se recomandă administrarea produsului numai după consultarea unui medic. 1 comprimat după mesele principale și/sau înainte de a merge la culcare sau la nevoie atunci când apar simptome cum ar fi durere și arsură la stomac. Dacă este necesar, comprimatul se poate diviza în două părți egale.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Începeți prin a dizolva comprimatul în gură și apoi mestecați-l. După utilizare, se poate bea apă sau lapte.

REAȚII ADVERSE

Utilizarea îndelungată poate cauza constipație din cauza efectului astringent al aluminiului. În prezent, nu se cunosc reacții adverse la supradozaj asociate cu ingredientele produsului.

CONTRAINDICAȚII

Insuficiență renală. Hipofosfatemie. Hipersensibilitate cunoscută la unul dintre ingrediente.

SARCINA ȘI ALĂPTAREA

Utilizați acest produs numai după ce ați consultat medicul.

ATENȚIONĂRI

Acest produs nu conține gluten, lactoză sau derivate din lapte.

Acest produs conține aluminiu, care poate interfera cu absorbția unor medicamente. Citrații pot crește absorbția de aluminiu. Dacă luați orice medicament, consultați medicul înainte de a utiliza produsul. Nu luați medicamente cu 1 oră înainte și 2 ore după administrarea produsului. A nu se depăși doza recomandată. În cazul unei reacții adverse, întrerupeți tratamentul și consultați un medic. Produsul conține zaharoză, fapt ce trebuie luat în considerare de către pacienții cu diabet. A nu se utiliza acest produs după data de expirare indicată pe cutie. Data de expirare se referă la produsul în ambalaj nedesfăcut și corect depozitat. A se păstra la temperaturi sub 30°C într-un loc răcoros și uscat, departe de surse de căldură. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În cazul unui incident grav legat de dispozitiv, producătorul trebuie informat imediat la adresa indicată în partea de jos a paginii, precum și autoritatea competentă. Rezumatul privind siguranța și performanța clinică a dispozitivului este disponibil la următorul link: <http://sofarswiss.ch/PublicAccess.htm>

Rev. 02 06/2025



0373



Dispozitiv medical



Lot nr.



A se păstra într-un loc uscat



A se păstra departe de lumina soarelui



Data de expirare AAAAMM



Atenționări



Consultați instrucțiunile de utilizare



A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat



Conține materiale biologice de origine animală



A se păstra la temperaturi sub 30°C



Unique Device Identifier

EU REP
Alfasigma S.p.A.
Via Ragazzi del '99, n. 5
40133 Bologna (BO)
Italia

 **Distribuitor pentru România:**
ADDENDA PHARMACEUTICALS S.R.L.
București, Calea Șerban Vodă, Nr. 133,
Corp A, Central Business Park, Etaj 2,
contact.ro@alfasigma.com

 **Producător:**
SOFAR SWISS SA
Via Nassa, 3
6900 Lugano - Elveția
telefon: +41 919232266
info@sofarswiss.ch
www.sofarswiss.com

ALFASIGMA 

45004431