



LAXIT[®] med
Macrogol 4000

10 g

pulbere pentru soluție orală

Instrucțiuni de utilizare

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de a folosi **LAXIT[®] MED**, pulbere pentru soluție orală, chiar dacă ați mai utilizat acest dispozitiv medical. Este posibil ca informațiile să se fi schimbat în conformitate cu cercetările sau descoperirile, în perioada ce a trecut din momentul în care ați deschis ultimul ambalaj.

Acest dispozitiv medical poate fi obținut fără prescripție medicală. Cu toate acestea este necesar să utilizați **LAXIT[®] MED**, pulbere pentru soluție orală, cu atenție pentru a obține cele mai bune rezultate. Păstrați aceste instrucțiuni; s-ar putea să aveți nevoie să le recitiți.

LAXIT[®] MED ajută la normalizarea tranzitului intestinal printr-o acțiune naturală, fără a irita mucoasa intestinală, fără a fi absorbit, fiind eliminat prin scaun în formă nemodificată.

Cum se prezintă?

LAXIT[®] MED este un laxativ sub formă de pulbere pentru soluție orală. Fiecare plic conține 10 g Macrogol 4000. Nu conține aromatizanți și nici alți excipienți.

O cutie conține 2/3/4/6/10/15/20/40 plicuri unidoză.

Când se recomandă?

LAXIT[®] MED se indică în tratamentul simptomatic al constipației la adulți și copii peste 8 ani.

Cum acționează?

Datorită afinității sale pentru apă, **LAXIT[®] MED** înmoaie materiile fecale ușurând evacuarea acestora. În acest mod furnizează o stare de bine și de eliberare. Nu provoacă crampe sau dureri abdominale. Eficiența produsului nu se reduce la utilizare îndelungată.

Efectul se instalează în 24-48 ore de la administrare.

Cum se utilizează?

Conținutul unui plic (10 g) se dizolvă în 100-200 ml apă și apoi se administrează pe cale orală. Pulberea se poate amesteca cu orice băutură, chiar și caldă, de tipul: ceai, lapte, suc de fructe sau supă.

LAXIT[®] MED nu modifică gustul băuturii. Se recomandă administrarea între mese sau, în cazul unei singure doze, seara înainte de culcare.

Cât se recomandă?

Datorită siguranței sale, **LAXIT[®] MED** permite o mare flexibilitate în ceea ce privește dozajul.

Dacă nu se prescrie altfel de către medic, se recomandă astfel:

Adulți: ● 1 plic de 1-3 ori pe zi, în funcție de răspunsul individual.

Pentru obținerea unui efect mai rapid, o doză de 2 plicuri (20 g Macrogol 4000) poate fi luată în administrare unică. În cazul utilizării prelungite, doza poate fi redusă la 1 plic de 1-2 ori pe zi, administrate în zile alternative (ex: într-o zi se poate administra 1 plic, de preferință seara înainte de culcare, iar în următoarea zi se pot administra 1 plic în intervalul dintre micul dejun și prânz și 1 plic seara înainte de culcare).

Copii: ● peste 8 ani: 1 plic de 1-2 ori pe zi

A nu se depăși doza maximă zilnică.

LAXIT[®] med

Macrogol 4000

10 g

pulbere pentru soluție orală

LAXIT[®] MED se utilizează până la restabilirea tranzitului intestinal normal, dar nu mai mult de 28 de zile consecutiv. Administrarea se poate relua după 2 zile de pauză.

Când nu se utilizează?

Nu utilizați **LAXIT[®] MED** în caz de hipersensibilitate la macrogol, afecțiuni inflamatorii intestinale severe (cum sunt colita ulcerasă, boala Crohn), megacolon toxic, perforație sau risc de perforație, ocluzie intestinală, sindrom abdominal dureros de cauză nedeterminată.

În timpul sarcinii și alăptării produsul va fi utilizat doar la recomandarea medicului.

Pesoanele predispuse la dezechilibre electrolitice, cum ar fi cele cu insuficiență hepatică sau renală, trebuie să utilizeze cu precauție **LAXIT[®] MED**.

Poate fi administrat LAXIT[®] MED împreună cu medicamente?

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu medicamentele, totuși se recomandă utilizarea produsului la distanță de 2 ore de la administrarea unui medicament pe cale orală.

Efecte nedorite:

Ocazional pot să apară distensii abdominale și/sau greață care dispar la utilizarea continuă.

Foarte rar se pot produce: eritem (pete roșii), urticarie sau reacții alergice grave (de tip anafilactic). În acest caz se întrerupe utilizarea și se consultă imediat medicul sau farmacistul.

Ce se întâmplă în caz de supradozaj?

Poate să apară diareea, care se rezolvă la reducerea dozei sau întreruperea administrării (tratamentul poate fi reluat cu doze mai mici).

Care sunt instrucțiunile de păstrare?



A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original.

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

Data expirării

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

Dispozitiv medical

LAXIT[®] MED, pulbere pentru soluție orală, este un dispozitiv medical din clasa IIb în concordanță cu Regulamentul 745/2017 pentru dispozitivele medicale.

Dacă prezentați un incident grav legat de acest dispozitiv medical, contactați producătorul și autoritatea competentă din țara de reședință:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Direcția Generală Dispozitive Medicale

Șos. Nicolae Titulescu nr. 58, 011144, sector 1, București

e-mail: mdevice@anm.ro

Producător



Fiterman Pharma S.R.L.

Str. Moara de Foc nr. 35, 700520, Iași, România

www.fitermanpharma.ro

Codul și data revizuirii textului:

Pr LX_{MED}-10g-plc-RO-00/21.04.2023

	Atenționare
	Număr lot (serie)
	Citiți instrucțiunile înainte de utilizare
	Producător
	Data de expirare
	Utilizare unică
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare
	Număr de referință
	Identificator unic al dispozitivului
	Dispozitiv medical



CE 1936

FITERMAN
PHARMA



22
PAP