

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Perio KIN

Encías
●●●
CUIDADO INTENSIVO

Gengivas
●●●
CUIDADO INTENSIVO

Gums
●●●
INTENSIVE CARE

Gencives
●●●
SOIN INTENSIF

Perio KIN
●●●
BRASIL

Perio KIN
●●●
NL

Perio KIN
●●●
PL

Perio KIN
●●●
RO

Perio KIN
●●●
GR

Perio KIN
●●●
CZ

Indicaciones:
Favorece la reducción de la placa dental, cuida y protege la encía.
Modo de uso:
PERIOKIN Enjuague
Efectuar dos enjuagues al día con 10 ml de producto sin diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Gel
Aplicar el gel dos o tres veces al día con un cepillo suave o un bastoncillo de algodón, realizando un masaje sobre las encías. También se puede aplicar el gel con el dedo, directamente sobre la encía, si el estado de las encías lo requiere.
PERIOKIN Spray
Destapar o frasco y colocar el pulsador, con la cánula orientable incorporada, sobre el tubo de salida de la válvula dosificadora. Presionar varias veces el pulsador hasta conseguir el llenado de la válvula. La aplicación se efectúa directamente presionando directamente a válvula e orientando a la cánula la salida de la solución hacia la zona afectada. Efectuar cuatro o cinco pulverizaciones sobre la zona afectada, dos o tres veces al día.
Después del uso de un producto **PERIOKIN**:
- No enjuagarse la boca.
- No cepillarse los dientes.
- No ingerir alimentos ni bebidas hasta transcurrido un mínimo de media hora.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorexidina o a alguno de los ingredientes del producto.
Efectos secundarios:
En algunos casos, puede presentarse alteración del gusto y sensación urente en la lengua, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
No ingerir:
Mantener a temperatura inferior a 30 °C.
Presentaciones (disponibles según mercado):
PERIOKIN Enjuague: frasco con 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo con 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco con 40 ml

Indicações:
Favorece a redução da placa bacteriana. Cuida e protege a gengiva.
Modo de utilização:
PERIOKIN Colútorio
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Gel
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou uma cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requires.
PERIOKIN Spray
Destapar o frasco e colocar o pulverizador, com a cânula orientável incorporada, no tubo de saída da válvula doseadora. Pressionar várias vezes o pulverizador até conseguir o enchimento da válvula. A aplicação efetua-se pressionando diretamente a válvula e orientando a cânula de saída de solução para a zona afetada. Efectuar quatro ou cinco pulverizações sobre a superfície afetada, duas ou três vezes ao dia.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contacto com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Evitar a ingestão do produto.
Storage:
Store product below 30 °C.
Presentations (only available in certain markets):
PERIOKIN Mouthwash: 250 ml bottle
PERIOKIN Gel: 30 ml tube
PERIOKIN Spray: 40 ml bottle

Indications:
Helps to reduce dental plaque. Protects and takes care of the gum.
Dosage and instructions for use:
PERIOKIN Mouthwash
Rinse with 10 ml of the undiluted product for 1 minute, twice a day.
PERIOKIN Gel
Apply the gel 2 or 3 times a day with a smooth toothbrush or cotton swab, massaging the gums.
PERIOKIN Spray
Insert the push button with the attached adjustable cannula onto the outlet pipe at the top of the bottle. Press the push button repeatedly until the valve is filled. The product is applied directly by pressing the push button and aiming the adjustable cannula onto the target area. Spray the affected area four or five times on each application, two or three times per day.
After the use of any PERIOKIN product:
- Do not rinse with water after its application.
- Do not brush teeth.
- Do not eat or drink until at least half an hour after use.
Contraindications:
PERIOKIN is contraindicated in patients who have shown a hypersensitive reaction to chlorhexidine or any of the ingredients.
Side effects:
Taste alteration and a slight burning sensation may occur in some cases. This generally diminishes with the continued use of the product.
Staining of the teeth and fillings can appear after long-term use and after contact with certain food and beverages, such as red wine, coffee or tobacco. This staining is not permanent and can be removed with a proper dental prophylaxis.
Do not swallow.
Storage:
Store product below 30 °C.
Presentations (only available in certain markets):
PERIOKIN Mouthwash: 250 ml bottle
PERIOKIN Gel: 30 ml tube
PERIOKIN Spray: 40 ml bottle

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

Indicazioni:
Favorece la riduzione della placca dentale. Cura e protegge la gengiva.
Dosaggio e modalità di somministrazione:
PERIOKIN Colutorio
Sciacquare il cavo orale con 10 ml di prodotto non diluito due volte al giorno per 1 minuto.
Indicaciones:
Favorece a redução da placa bacteriana. Higiene periodontal e perimplantar. Proteção antiplaca bucal.
Modo de utilização:
PERIOKIN Enxágue Bucal
Efectuar dois bochechos por dia com 10 ml de produto sem diluir, durante 1 minuto.
PERIOKIN Spray
Aplicar o gel duas ou três vezes por dia com uma escova macia ou um cotonete de algodão, realizando uma massagem nas gengivas. Também se pode aplicar o gel com o dedo, diretamente na gengiva, se o estado das gengivas assim o requerer.
Após a utilização de qualquer produto da gama **PERIOKIN**:
- Não bochechar após a sua aplicação.
- Não escovar os dentes.
- Não ingerir alimentos nem bebidas na meia hora seguinte, no mínimo.
Contraindicaciones:
PERIOKIN está contraindicado em pacientes que tenham mostrado reação de hipersensibilidade à clorexidina o a qualquer um dos ingredientes do produto.
Efeitos secundários:
Em alguns casos pode provocar alteração do gosto e sensação de queimadura na língua, que geralmente diminui com o uso contínuo do produto.
O uso prolongado e o contato com certas bebidas ou alimentos, tais como o vinho ou café e, também o tabaco, pode ser o responsável pelo aparecimento de coloração nos dentes. Esta coloração não é permanente e pode eliminar-se com uma profilaxia dentária adequada.
Não ingerir.
Conservação:
Mantir a temperatura inferior a 30 °C.
Apresentações (disponível según mercado):
PERIOKIN Enxágue Bucal: frasco com 250 ml
PERIOKIN Gel: tubo com 30 ml
PERIOKIN Spray: frasco com 40 ml

El consejo de su odontólogo y de su farmacéutico le garantiza una óptima salud bucodental.

O conselho do seu médico dentista e do seu farmacéutico garantem-lhe uma ótima saúde oral.

Ask your dentist and pharmacist for advice. This will ensure optimal oral and dental health.

Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous garantit une santé bucco-dentaire optimale.

O aconselhamento do seu dentista e do seu farmacéutico lhe garantem uma ótima saúde oral.

Chieda consiglio al suo dentista e farmacista di fiducia. Ciò assicurerà l'ottimale salute orale e dentale.

Die Ratgeberseite Ihres Zahnarzte, Apothekers oder Zahnhygienikers sind eine Garantie für die optimale Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.

Die Ratgeberseite Ihres Zahnarzte, Apothekers oder Zahnhygienikers sind eine Garantie für die optimale Gesundheit von Zähnen und Zahnfleisch.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

Conținutul produsului este destinat numai pe anumite probleme.

10 mm

10 mm

PLEGADO FINAL 34,5 mm

10 mm

ANVERSO

TAMAÑO 620 x 155 mm

PLEGADO FINAL 34,5 X 155 mm

CO65921607

