

ESOXX

ONE

Plic monodoză

Dispozitiv medical destinat tratării **refluxului gastroesofagian**

INDICAȚII: **ESOXX ONE** este un dispozitiv medical cu acțiune mecanică ce permite reducerea rapidă a simptomelor legate de refluxul gastroesofagian, cum ar fi: pirozis, durere epigastrică, regurgitație acidă, tuse iritativă, disfonie.

Boala de reflux gastroesofagian (prescurtată în mod obișnuit ca BRGE) este caracterizată prin simptome: pirozis, regurgitație acidă, tuse iritativă, disfonie care pot fi sau nu asociate cu leziuni inflamatorii erozive ale mucoasei esofagiene. BRGE este de obicei agravată în poziția orizontală, prin urmare simptomele se pot intensifica pe timpul nopții.

ESOXX ONE conține o combinație de acid hialuronic și sulfat de condroitină, care protejează membrana mucoasă gastroesofagiană printr-un mecanism original și inovator.

Prezența unei componente cu bioadezivitate ridicată (poloxamer 407) în formularea **ESOXX ONE**, permite acidului hialuronic și sulfatului de condroitină să rămână la suprafața peretelui esofagian, contribuind astfel la efectul protector împotriva acțiunii acidului clorhidric produs în stomac.

Sulfatul de condroitină are, de asemenea, o acțiune care favorizează procesul de vindecare a mucoasei gastroesofagiene.

COMPOZIȚIE: Acid hialuronic, sulfat de condroitină, polivinilpirolidonă, xilitol, benzoat de sodiu, sorbat de potasiu, aromă de struguri, apă demineralizată, poloxamer 407.

FORMA DE PREZENTARE: 14 plicuri monodoză a câte 10 ml.

DOZE ȘI MOD DE UTILIZARE: Un plic monodoză după masă și seara înainte de culcare sau conform indicațiilor medicului.
Siropul poate fi consumat direct din plic.

CONTRAINDICAȚII: Nu există contraindicații specifice, cu excepția cazurilor de hipersensibilitate la oricare dintre componente. În aceste cazuri, opriți tratamentul și contactați medicul.

Deși nu există efecte secundare cunoscute, nu se recomandă utilizarea produsului în timpul sarcinii sau în primele luni de alăptare. În orice caz, este indicat să consultați medicul înainte de utilizare. Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte produse cu administrare orală.

ATENȚIONĂRI: A nu se depăși doza recomandată. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

Nu administrați produsul copiilor cu vârsta sub 12 ani, deoarece nu sunt disponibile date clinice la copiii sub 12 ani.

Nu utilizați acest produs după data de expirare înscrisă pe cutie. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură. A nu se congela. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Producător: Biofarma - Via Castelliere, 2 - 33036 Mereto di Tomba (UD) – Italia

Distribuitor: Addenda Pharmaceuticals S.R.L.

Calea Șerban Vodă, Nr. 133, Corp A, Central Business Park, Etaj 2, Sector 4, București, România



Rev. 12/2022

ALFASIGMA 

45004714
(IFU1_12/22r0_04/26)