

Obesimed® Forte este un dispozitiv medical folosit pentru pierderea in greutate. Este destinat adultilor in varsta de 18 ani si peste si care sunt supraponderali cu mai mult de 10 kilograme sau au un indice de masa corporala (IMC - BMI) de 28 sau mai mare. Pentru a garanta rezultate bune, se recomanda ca Obesimed® Forte sa fie utilizat alaturi de o dieta cu un aport redus de calorii.

IMC este o modalitate de a determina daca aveti o greutate corporala sanatoasa sau daca sunteti supraponderal pentru inaltimea dumneavoastra. Puteti afla daca sunteti supraponderal utilizand diagrama de mai jos.

Înălțime	Greutate	Înălțime	Greutate
1,50 m	63 kg	4' 10"	9st 8lbs
1,55 m	67,25 kg	5' 0"	10st 3lbs
1,60 m	71,75 kg	5' 2"	10st 13lbs
1,65 m	76,25 kg	5' 4"	11st 9lbs
1,70 m	81 kg	5' 6"	12st 5lbs
1,75 m	85,75 kg	5' 8"	13st 2lbs
1,80 m	90,75 kg	5' 10"	13st 13lbs
1,85 m	95,75 kg	6' 0"	14st 10lbs
1,90 m	101 kg	6' 2"	15st 8lbs

Daca greutatea dvs. este mai mica decat greutatea indicata pentru inaltimea dumneavoastra, nu luati Obesimed® Forte.

Indicele IMC poate fi utilizat numai pentru adulti si nu poate fi aplicat in toate cazurile. Nu trebuie utilizat de catre copii, femei gravide sau sportivi de varf.

Recomandari generale: Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de a lua Obesimed® Forte, chiar daca ati utilizat acest produs inainte, deoarece acesta poate fi modificat conform unor noi cercetari si descoperiri in perioada de timp de la deschiderea ultimului pachet. Nu este nevoie sa aveti o reteta pentru acest dispozitiv medical. Cu toate acestea, trebuie sa utilizati cu atentie Obesimed® Forte pentru a obtine rezultate bune. Pastrati aceste instructiuni pentru utilizare in cazul in care trebuie sa le consultati din nou.

Cum functioneaza Obesimed® Forte?

Obesimed® Forte ofera o abordare diferita pentru pierderea in greutate, prin utilizarea unei combinatii de polizaharide vascoase inalt purificate si naturale care isi multiplica reciproc efectele. Obesimed® Forte absoarbe de sute de ori propria greutate in apa in decurs de 30 de minute pana la o ora. Cand se dizolva capsula, se extinde in stomac pentru a deveni o matrice de gel stabila, foarte vascoasa. Acest lucru creeaza un sentiment de plenitudine, prin urmare dimensiunile portiei de mancare pot fi reduse si devine mult mai usor sa se urmeze o dieta cu o cantitate limitata de calorii. Dupa masa, matricea de gel se amesteca cu alimentele. Acest lucru nu va amana numai pofta de mancare, dar va incetini, de asemenea, procesul de digestie. Obesimed® Forte asigura ca simtiti mai putina foame din cauza senzatiei de satietate conferita stomacului si promovarii unui nivel sanatos de zahar din sange.

Dozare si utilizare: Luati 1 pana la 2 capsule de 3 ori pe zi, cu o ora inainte de fiecare masa, cu cel putin 1 pahar de apa. Capsula trebuie inghitita in intregime.

Doza efectiva poate fi diferita pentru fiecare persoana si poate varia de la 1 la 2 capsule pe doza pana la o doza maxima de 6 capsule de 3 ori pe zi.

Doza poate fi marita la fiecare 3 zile cu 1 capsula per masa, pana cand senzatia de foame intre perioadele de pofta de mancare se reduce semnificativ. Nu depasiti doza maxima.

Nu utilizati Obesimed® Forte mai mult de 30 de zile intr-o singura perioada de tratament. Tratamentul poate fi reluat dupa 4 zile.

Acest produs nu este adecvat copiilor.

Ingrediente: Produsul se bazeaza pe ingrediente vegetale: Omtec19®, Amylum Solani, Omtec20®, hipromeloza (E464), Oleum Helianthus, oxid de titan (E171).

Produsul este potrivit pentru vegetarieni. Acest produs nu contine alergeni.

Utilizare in timpul sarcinii si/sau alaptarii: Pierderea in greutate nu este recomandata in timpul sarcinii sau alaptarii, deoarece substantele nocive din tesutul adipos (denumite si grasimi corporale) pot fi transmise copilului. Prin urmare, utilizarea Obesimed® Forte nu este recomandata.

Utilizare in asociere cu alte medicamente: Obesimed® Forte scade nivelul glucozei din sange. Daca aveti diabet, este important sa monitorizati corect nivelul glicemiei. Adresati-va medicului dumneavoastra deoarece este posibil ca medicamentul dumneavoastra pentru diabet zaharat sa fie ajustat.

Utilizarea Obesimed® Forte in asociere cu alte suplimente alimentare sau medicamente care au un efect hipoglicemic nu este recomandata atunci cand medicul sau farmacistul nu a fost consultat in prealabil.

Obesimed® Forte încetinește rata de absorbție a alimentelor și poate face teoretic același lucru cu medicamentele. Medicamentele administrate pe cale orală trebuie luate cu o oră înainte sau după 4 ore după utilizarea Obesimed® Forte. Consultați medicul sau farmacistul dumneavoastră dacă luați medicamente înainte de a începe să utilizați Obesimed® Forte.

Multivitamine și Obesimed® Forte: Ar trebui să luați un preparat multivitaminic și minerale în fiecare zi în timp ce pierdeți din greutate și folosiți Obesimed® Forte. Obesimed® Forte scade nivelul anumitor vitamine și minerale absorbite de organism. După preferință, luați suplimentul de vitamine și minerale înainte de culcare pentru a vă ajuta și pentru a vă asigura că vitaminele și mineralele sunt absorbite de corpul dumneavoastră.

Contraindicații: Nu utilizați Obesimed® Forte în următoarele situații:

- dacă sunteți suprasensibil la unul sau mai multe ingrediente;
- dacă ați suferit de tulburări gastro-intestinale;
- dacă ați suferit de stenoza esofagiană sau de anomalii intestinale preexistente;
- când sunteți gravidă sau alăptați.
- dacă aveți vreo îndoială cu privire la faptul că puteți utiliza Obesimed® Forte și/sau dacă puteți utiliza produsul în asociere cu medicamente, consultați mai întâi medicul sau farmacistul.

Nu deschideți capsula înainte de utilizare. A nu se lăsa la îndemână copiilor mici.

Efecte secundare posibile: Obesimed® Forte este bine tolerat, dar poate duce la câteva efecte secundare, deși nu toată lumea suferă de aceste reacții adverse. Pot apărea manifestări initiale de tulburări gastrice stomacale și intestinale, cum ar fi scaune subțiri sau rare, diaree ușoară, reflux și formare de gaz sau constipație. De obicei, aceste efecte secundare dispar după câteva zile. Pentru a evita aceste reacții adverse, începeți cu o doză mică (1 capsulă pe masă) și apoi creșteți treptat cantitatea pe măsura ce organismul se ajustează. Dacă vreuna dintre aceste reacții adverse devine gravă sau dacă observați orice reacții adverse care nu sunt menționate în aceste instrucțiuni de utilizare, consultați medicul sau farmacistul.

Depozitare: A se păstra la temperatura camerei (15-25°C) într-un loc uscat și întunecos, în recipientul original și departe de accesul copiilor mici.

Dispozitiv medical: Obesimed® Forte este un dispozitiv medical de clasă IIa conform Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.