

Loroblis Baby®

Compoziție

- Un plic cu pulbere orodispersabilă LOROBLIS Baby® conține (minimum) 1×10^9 Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) și 5 μg vitamina D3.
- Streptococcus salivarius K12 este o tulpină bacteriană care colonizează cavitatea bucală și nazofaringele indivizilor sănătoși și face parte din flora bacteriană normală.

Mecanism de acțiune

- Streptococcus salivarius K12 este o tulpină bacteriană comensală ce produce 2 bacteriocine: peptidele antimicrobiene Salivaricin A2 și Salivaricin B care au potențialul de a inhiba dezvoltarea tulpinilor bacteriene patogene, responsabile pentru faringite și amigdalite bacteriene, otite medii acute și halitoză (de exemplu, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis).
- Streptococcus salivarius K12 are potențialul de a mentine și de a restabili eubioza la nivelul cavității bucale și a faringelui.
- Streptococcus salivarius K12 are activitate antivirală, anti-inflamatorie și proprietăți antimicotice, susținute de studii in vitro și in vivo.

Recomandare

Studiile clinice au arătat că LOROBLIS Baby® contribuie la menținerea și dezvoltarea unei flore microbiene cu rol protectiv la nivelul cavității orale și a faringelui, cu potențial în:

- Profilaxia infecțiilor tractului respirator superior (faringită, amigdalită, otită medie);
- Terapia infecțiilor ușoare și medii ale tractului respirator superior;
- Terapia afecțiunilor inflamatorii orale (stomatită, gingivită, candidoză, halitoză);
- Terapia de susținere după tratamentul antibiotic al infecțiilor tractului respirator superior.

Mod de administrare

- LOROBLIS Baby® se recomandă 1 plic/ zi, dizolvat lent în cavitatea orală, seara după igiena orală, în funcție de recomandarea medicului dumneavoastră, timp de 90 de zile.
- **!!! Se umezește suzeta, se impregnează cu pulbere și se lasă în gura copilului câteva minute (până la ingerarea completă a pulberii). Se repetă operațiunea de mai multe ori, până la terminarea conținutului pliculețului.**
- A nu se dizolva în lichide sau alte alimente!
- Este inutilă administrarea LOROBLIS Baby® concomitent cu antibioticul din cauza sensibilității puternice la antibiotice a tulpinii Streptococcus salivarius K12;
- Persoanele imunodeprimare care urmează anumite tratamente (chimioterapie, radioterapie), ori au leucopenie severă, să consulte medicul înainte de administrarea produsului.

