



GERDOFF® PROTECTION

Medicīniskā ierīce
grēmām un gastroezofageālajam atvilnim



Gastroezofageālā atvilja slimība (nosaukums bieži tiek saisināts kā GEAS) ir funkcionāla slimība, kam raksturiga tādu tipisku simptomu kombinācija:

- Grēmas (retrosternāla piroze)
- Skābas vai sārmainas atraugas
- Atraugas pozas dēļ (gulot uz muguras)
- Atraugas naktis laikā
- Krampi
- Nesāpīgi rišanas traucējumi (disfagija)
- Kairinošs klepus
- Klepus naktis
- Disfonija (aizsmakums, afonija)

Šie simptomi var būt un var nebūt saistīti ar erozīviem, iekaisīgiem barības vada gлотādās bojājumiem. Nepilnvērtīgs uzturs vai stresa pilns dzivesveids var būtīgi ieteiktām kунжā sulas veidošanos, kунжā skābes paaugstināšanos un kairinošas un sāpīgas dedzināšanas sajūtas, ipaši pēc ēdienei reizes, veidošanos.

Šīs pārmērīgais skābумus var būt sajūtams arī pie kунжā ieejas ar dedzināšanu, krampiju, uzpūšanās un nelabuma sajūtu. GEAS var rasties arī miega laikā, jo gulus stāvoklis lāuj kунжā sulām ieplūsti barības vādu. Tā kā barības vada sienīnas nav piemērotas kунжā skābei, tas izraisa dedzināšanas sajūtu krūsu kurvi.

Indikācijas

GERDOFF® PROTECTION ir medicīniskā ierīce ar mehānisku iedarbību, kas ir paredzēts:

- Gastroezofageālā atvilja slimības simptomātiskai ārstēšanai. Ātri sazināma simtomus, tādus kā: grēmas (piroze), skābas vai sārmainas atraugas, skābas atraugas un atraugas pozas dēļ un atraugas naktis laikā, sāpes pakrūtī, kairinošs klepus un klepus naktis, disfonija.
- Kunjā izdalīto skābju kairinošās iedarbības radīto bojājumu profilaksei.

Īpašības

GERDOFF® PROTECTION ir oriģināla un novatoriska hondroitīna sulfāta, hialuronskābes, alvejas ekstrakta un medus kombinācija, kas izmantojama kā vienlaikus lietojams papildlidzēkļi simptomātiskai gastroezofageālā atvilja slimības ārstēšanai, jo tas:

- Mitrina, iiezīze un aizsargā - veido viskozu slāni, kas pārklāj barības vada gлотādu, tai pielipot, un darbojas kā barjera, kas aizsargā gлотādu no saskares ar ārējiem faktoriem. Atvieglo kairinājumu, baro audus un palīdz tieši normālii funkcionēt;
- Mitrina un nomierina mutes, balsenes un barības vada gлотādu, palīdzot vājināt biežākos GEAS simtomus un atvieglo klepu;
- Aizsargā bojātos kупūja audus un palīdz atjaunoties bojātajai gлотādai, palīdzot nepieejaut kунжā izdalīto skābju kairinošās iedarbības radītos bojājumus.

Lidzeklis sirupa un pacīju formā nodrošina labāku tā sastāvdāļu saskari ar barības vada sienām, tās aizsargājot un iiezīzot.

- Hondroitīna sulfāts noklāj barības vada gлотādu aizsargājot to pret kунжā sulas iedarbību.
- Hialuronskābe, kombinācijā ar hondroitīna sulfātu adhezīvām īpašībām, palīdz aizsargāt un atjaunot bojātos kунжā audus.



GERDOFF® PROTECTION

Medicīnos priemonē nuo
rēmens ir gastroezofaginio refluksa



Gastroezofaginjo refluksa liga (GERL) yra funkcionē liga, susijusi su keletu tipinīgi simptomu, toki kaip:

- Deginimas uz krūtinkaulio (rémuo)
- Rūgštinio arba šarminio turinio atpylimas
- Turinio atpylimas priekšķīlās nuo pozicijos (atsigulus)
- Turinio atpylimas naktī
- Spazmai
- Neskausmingas apsunkintas rijimas (disfagija)
- Dirginātis kosulys
- Naktinīs kosulys
- Disfonija (užķimimas, balso netekimas)

Šie simptomai gali būti susiję su eroziniju uždegiminiu pakitimu stemplēs gleivinēje. Prasta mitība ar iemētās gvenīmo būdas gali turēti didelī poveikī skrandžio sulčių gamybai ir sukelti dirginām bei skausmingā deginīmā pojūtī, ypač po valgī.

Šīs pernelyg didelis rūgštingumas kartu su deginīmā pojūčiu, spazmās, išspūtīmu ir pykñīmu gali būti jaučiamas skrandžio srityje. GERL taip pat gali pasireikšīti miego metu, kai gulējimo poza sukelia skrandžio sulčių tekējimā jā stempī. Kadangi stempīs sienelēs nēra skirtos toleruoti skrandžio rūgšīt, tai sukelia deginīmā pojūtī krūtinēje.

Indikācijas

GERDOFF® PROTECTION yra mechanīnīs veikīmo medicīnos priemonē, skirta:

- Simptomām gastroezofaginjo refluksa ligos gydymui. Jis griezītai numalšīnā gastroezofaginjo refluksu simptomus, tokius kaip: deginimas uz krūtinkaulio (rémuo), rūgštinī arba šarminio turinio atpylimas, skrandžio turinio atpylimas priekšķīlās nuo pozicijos ir skrandžio turinio atpylimas naktī, epigastrīumo skausmas, dirginātis kosulys ir naktinīs kosulys, disfonija.
- Apsaugoti nuo dirginācīo druskos rūgšties, gaminamos skrandje, poveikī.

Savībēs

GERDOFF® PROTECTION yra originalus ir inovatīvus chondroitīno sulfātu, hialuronu rūgšties, alavījo ir medaus kompleks, kuri gali būti naudojamas simptomām gastroezofaginjo refluksa gydymui, nes:

- Drēkina, suteip ar apsaugu: suformuoja klampu sluojsnī, kuri padengia stempīs gleivinē, priekšķīdamas priejos ir, veikdamas kāp barjeras, apsaugo gleivinē nuo salīgoju sīorinās veiksnīas; malšīna sudirginīmā, maitīna audinīs ir padeida jēms tīnkamai funkcionuoti.
- Drēkina ir ramina burnos ir ryklēs bei stempīs gleivinē, palengvinādažnīsai pasītaikānius GERL simptomus ir malšīna kosulī.
- Apsaugoti pažīstītos skrandžio audinīus, skatīna pažīstītos gleivīnes atsinašīnīmā, padēdāmas apsaugoti nuo skrandje gamināmos rugstīties dirginācīo poveikī.

Dēl preparato formos yra pasiekīmas gerēsīs sālytis tarp sudedamujū daliū ir stempīs sienelēs, todēl pagājēja stempīs apsauga ir suteipīmas.

- Chondroitīno sulfātu prilimpa prie stempīs-skrandžio gleivinēs ir apsauga izoliuodamas jāsnu skrandžio sulčių poveikī.
- Hialuronu rūgšties, kartu su adhezīvām chondroitīna sulfātu savībēmis, padēda apsaugoti ir atstatyti pažīstā stempīs gleivinē.

Medus turi raminājām, drēkinājām ir apsaugījū poveikī; formuodamas barjericē plēvēlē ant stempīs gleivinēs, apsaugo ir drēkina ja, tuo paču malšīna skausmā. Medus taip pat veikia burnos ir ryklēs gleivinē, ramina gerklēs skausmā, kurj sukulē rūgšīci atpilmas.

Alavījas kartu su medumi sukuria barjericē efekta, tuo suspirindamas, ramindamas ir apsaugodamas stempīs gleivinē. Alavījas pasīzīmi skrandžio apsaugānciems savībēmis dēl jāme esančū mukopolsacharīdu: jie, pasīkirstē skrandžio gleivinēje, sudaro plēvēlē, apsaugānci nuo rūgšīci ar dirginācīu medžiągā, kurios kitu atveju paveiktu normalu skrandžio darbā.

Sudētis

Vandū; medus; maltodekstrīnas; fruktoze; chondroitīna sulfātā; kalio fosfātā; dikalio fosfātā; ksantano derva; natrio hialuronāts; tīkrojo alavījo (*alavījo barbadensis*) gelis; guaro derva; bananu kvapījo medžīga; grietinēls kvapījo medžīga; natrio hidroksīdā; metil-4-hidroksibenzāto natrijā; natrijā propilparabenās.

Pakuotē

200 ml daugiadzis buteliukas • 20 paketēli po 10 ml kiekvienam paketēlyje.

Dozavīmas ir naudojimās

Dozavīmas suaugusiesiems ir vyresniems kaip 12 metū vaikams: 10-20 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Dozavīmas vyresniems nei 6 metū vaikams:** Patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās naudoti preparatu iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10 ml po pagrindinī valgū ir prieš miegu, arba esant poreikui numalšīni simptomus, tokius kaip skrandžio skausmas ir deginīmā jausmas, patariama naudoti tik pasītarus su gydymu. **Naudojimās** Prieš naudojimās dozavīmas iemētās īpārā. **Naudojimās dozavīmas** 10